


52% van de patiënten met gemetastaseerd melanoom die behandeld werden met OPDIVO + YERVOY is na 5 jaar nog in leven! ^{**1}

Overall Survival



No. at Risk

Nivolumab plus ipilimumab	314	292	265	248	227	222	210	201	199	193	187	181	179	172	169	164	163	159	157	155	150	92	14	0
Nivolumab	316	292	266	245	231	214	201	191	181	175	171	164	158	150	145	142	141	139	137	135	130	78	14	0
Ipilimumab	315	285	253	227	203	181	163	148	135	128	113	107	100	95	94	91	87	84	81	77	73	36	12	0

Het OS voordeel met OPDIVO + YERVOY bleek onafhankelijk van de BRAF-mutatiestatus, de LDH-waarde en de PD-L1 expressiestatus op baseline

- 5-jaars update Checkmate 067; een fase III-studie met 5 jaar follow-up van een combinatiebehandeling met immuuncheckpointremmers bij patiënten met gemetastaseerd melanoom¹
- 5 Jaar follow-up toont aan dat met OPDIVO + YERVOY en monotherapie OPDIVO een significant langere overleving wordt behaald dan met monotherapie YERVOY¹
- Vergeleken met YERVOY hebben patiënten met OPDIVO + YERVOY een hogere kans om in leven en behandelingsvrij te zijn¹

* OPDIVO als monotherapie voor de adjuvante behandeling van melanoom bij volwassenen waarbij de lymfeklieren betrokken zijn of in geval van gemetastaseerde ziekte waarbij volledige resectie is uitgevoerd²

§ OPDIVO als monotherapie of in combinatie met ipilimumab voor de behandeling van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom bij volwassenen^{2,3}

** De trial was niet ontworpen voor een statistische vergelijking tussen nivolumab plus ipilimumab groep en de nivolumab groep, maar beschrijvende analyses zonder formele hypothese testing werden gedaan